



Organización Panamericana de la Salud

Oficina Sanitaria Panamericana,

Oficina Regional para las Américas

Organización Mundial de la Salud

Análisis de las condiciones de salud de las personas adultas mayores en América Latina y el Caribe

**con especial referencia a siete ciudades del
Encuesta SABE (OPS/NIA)**

América Latina y el Caribe (2000/2025): Adultos mayores por países según el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

IDH	Países	Adultos Mayores				Crecimiento Medio Anual %
		Proporción (%)		Millones		
		2000	2025	2000	2025	
América Latina y El Caribe		8.0	141	41,505	97,267	3.41
Alto	Argentina, Barbados, Bahamas, Chile, Costa Rica, Trinidad Tobago, Uruguay	12.6	17.5	7,537	13,442	2.31
Medio	México, Cuba, Panamá, Belice, Colombia, Venezuela, Brasil	7.3	16.7	26,418	67,295	3.74
Medio Bajo	Perú, Jamaica, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Guyana, El Salvador	6.9	12.3	4,316	10,627	3.60
Bajo	Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Haití	5.4	6.6	1,821	4,312	3.45

América Latina y el Caribe (2000/2025): Adultos mayores por países según el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

IDH	Países	Adultos Mayores				Crecimiento Medio Anual %
		Proporción (%)		Millones		
		2000	2025	2000	2025	
	América Latina y El Caribe	8.0	141	41,505	97,267	3.41
	Argentina	13.3	16.6	4,925	7,819	1.85
	Brasil	7.8	15.2	13,314	33,517	3.69
	Cuba	13.7	25.1	1,534	29,610	2.61
	México	6.9	13.5	6,223	17,576	4.15

Países seleccionados de América Latina y el Caribe (1950 y 2000): Esperanza de vida al nacer - e(o)

Diferencias extremas en 1950 de hasta:



27.0 años (Hombres)

30.5 años (Mujeres)

Diferencias extremas en 2000 de hasta:


17.2 años (Hombres)

19.0 años (Mujeres)




Edad media a ser alcanzada al nacer (2000)

Hombres




Mujeres




Edad media a ser alcanzada por: los adultos mayores de 60 años (2000)

Hombres




Mujeres




Edad media a ser alcanzada por: los adultos mayores de 80 años (2000)

Hombres



Mujeres



Esfuerzos en la Salud


Gastos en salud y esperanza de vida al nacer

País	$e_{(0)}$	Gastos en Salud	
		Per cápita (US\$)	% del PIB
Barbados	74.9	769.0	6.7
Argentina	74.9	972.0	8.5
Guatemala	66.6	119.0	4.4
Bolivia	64.2	109.0	6.5
Haití	59.3	41.0	4.2
Noruega	78.9	2824.0	9.2
Estados Unidos	77.5	4222.0	12.8
Suiza	80.1	3857.0	10.4

Fuente: PNUD/ 2001 y 2002

Organización Panamericana de la Salud 2003

Índice de bienestar del Adulto Mayor -IBAM- (nacional y urbano) e Índice de Desarrollo Humano -IDH- para países seleccionados de América Latina y el Caribe (Circa 1997)



Adaptado de: Papolo F. (2001) - Características Sociodemográficas y Socioeconómicas de las personas de edad en América Latina - Serie Población y Desarrollo - 19 - CEPAL/NU - p. 19.

La Salud según la Encuesta SABE

Ciudades de la Encuesta SABE (1999/2000) con indicación del número de entrevistas y edad media de los adultos de 60 y más años de edad - por sexo.

Ciudad	Número de Entrevistas	Edad Media de los Entrevistados	
		Hombres	Mujeres
Bridgetown	1,812	72.3 (*)	72.4 (*)
Buenos Aires	1,043	70.3	71.0
Ciudad de México	1,450	69.0	70.2
Habana	1,905	70.2	71.7
Montevideo	1,311	70.7	71.0
Santiago de Chile	1,450	69.3	70.9
Sao Paulo	2,143	68.9	69.7

Total de Entrevistas: 10,970


(*) Sin ponderar

Las condiciones que alteran el equilibrio físico, mental y psíquico del adulto mayor

1. Presión alta
2. Artroses
3. Diabetes
4. Enfermedad pulmonar crónica
5. Cáncer
6. Depresión
7. Problemas nerviosos
8. Ataque al corazón o similares
9. Embolia, derrame o similares
10. Fractura de la cadera
11. Fractura de la muñeca
12. Osteoporosis
13. Incontinencia urinaria
14. Audición deficiente (aun con audífonos)
15. Vista deficiente (aun con lentes)
16. Ausencia mayoritaria de dientes o muelas *
17. Dificultad frecuente para comer
18. Adicción a la bebida y al tabaco
19. Masa muscular extremadamente anormal
20. Ausencia de mano (s)
21. Ausencia de extremidad (es) superior (es)*
22. Ausencia de extremidad (es) inferior (es)*

* Sin uso de prótesis

Población de 60 y más años de edad según el número de condiciones que afectan su salud (por cien)




Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA


Organización Panamericana de la Salud 2003

Población de 60 años y más con determinado número de condiciones que afectan la salud, por sexo

a) Con una o ninguna condición que afecte su salud (%)



b) Con cuatro o más condiciones que afectan su salud (%) por sexo



Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Hacia un análisis exploratorio:

- **Contexto actual**
 - **Estrato socioeconómico**
 - **Hábitos alimenticios**

- **Contexto pasado**
 - **Calidad de vida durante la infancia**
 - **Número de hijos nacidos vivos**

El perfil individualizado de las enfermedades

- **Condición crónica típica de la vejez:**
 - **Hipertensión**
- **“Condiciones” que afectan la salud:**
 - **Síntomas depresivos**
 - **Incontinencia urinaria**
- **Enfermedades relacionadas con la edad:**
 - **Osteoporosis**
 - **Alzheimers**
- **Enfermedad más discapacitante**
 - **Artrosis**


Población de 60 años y más de edad con hipertensión diagnosticada, por sexo (%)



(*)Para las edades 70 y más


Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Sao Paulo (1999/2000): Población de 60 a 69 años de edad con hipertensión diagnosticada según estrato socio-económico (%)



Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Población de 60 años y más de edad con síntomas depresivos, por sexo (%)




(*Para las edades 70 y más)

Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Ciudad de México

Población de 60 a 69 con síntomas depresivos (%)




Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Organización Panamericana de la Salud 2003

Montevideo


Población de 60 a 69 años de edad con síntomas depresivos (%)



Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Organización Panamericana de la Salud 2003

Mujeres de 60 y más años de edad con osteoporosis (%)




(*)Para las edades 70 y más

Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Organización Panamericana de la Salud 2003

Ciudad de México

Población de 60 a 69 con síntomas depresivos (%)




Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Organización Panamericana de la Salud 2003

Montevideo


Población de 60 a 69 años de edad con síntomas depresivos



Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Organización Panamericana de la Salud 2003


Mujeres de 60 años y más de edad con diagnóstico de osteoporosis, según estrato socio-económico (%)



Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Organización Panamericana de la Salud 2003


Población de 60 años y más que padece artrosis, por sexo (%)



(*)Para las edades 70 y más

Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Adultos mayores por grupos de edad y sexo, con artrosis diagnosticada



Fuente: SABE- 1999/2000 – OPS/NIA

Organización Panamericana de la Salud 2003



Organización Panamericana de la Salud

**Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional para las Américas
Organización Mundial de la Salud**